

SPECIE UTILIZZATE


Alberi


- in floscia
- Ac *Acer campestre*
- Cb *Carpinus betulus*
- Fo *Fraxinus ornus*
- Fox *Fraxinus oxycarpa*
- Mn *Morus nigra*
- Pav *Pinus austriaca*
- Qr *Quercus robur*
- Sa *Salix alba*
- St *Stellaria media*
- Tb *Taxus baccata*
- Tc *Tilia cordata*
- Tp *Tilia platyphyllos*
- Um *Ulmus minor*
- Acro *Acer campestre*
- Carp *Carpinus betulus*
- Omi *Osmunda*
- Fass *Fraxinus meridionalis*
- Gel *Gelbeleiche*
- Cal *Calceolus*
- Fam *Famula*
- Sil *Silene alba*
- Cav *Cavendishia*
- Tass *Taxus*
- Til *Tilia cordata*
- Tilp *Tilia platyphyllos*
- Olm *Olm campestre*

Arbusti

- h 60-80 cm
- Bs *Buxus sempervirens*
- Bv *Berberis vulgaris*
- Co *Cornus mas*
- Cs *Cornus sanguinea*
- Cr *Corylus avellana*
- Fa *Frangula alnus*
- Lv *Ligustrum vulgare*
- Pr *Prunus spinosa*
- Pc *Pyracantha coccinea*
- Vil *Viburnum lantana*
- Vo *Viburnum opulus*
- Bosso *Bosso*
- Cornio *Cornio*
- Sanguinello *Sanguinello*
- Nocciuolo *Nocciuolo*
- Frangula *Frangula*
- Liquistro *Liquistro*
- Prospino *Prospino*
- Agazzino *Agazzino*
- Laricina *Laricina*
- Prilino di maggio *Prilino di maggio*
- Vi *Viburnum*
- Vo *Viburnum*
- Cr *Cornus*
- Ps *Prunella*
- Bv *Berberis*
- Ac *Acer*
- St *Stellaria*
- Cs *Cornus*

Ala gocciafante



- | | |
|---|---|
|  | Fondo cava sistemato, inerbito |
|  | Scarpata provvisoria, inerbita |
|  | Scarpata definitiva, banquettes di bosco planiziale mesofilo |
|  | Fondo cava sistemato a bosco planiziale mesofilo |
|  | Area umida con essenze igrofile (bacino raccolta acque meteoriche, q=-11.5 m da p.c.) |
|  | Interventi vegetazionali realizzati e/o previsti nelle aree di cava adiacenti |